



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И  
ФИТОСАНИТАРНОМУ  
НАДЗОРУ  
(Россельхознадзор)**

**Главам муниципальных  
образований  
Иркутской области  
(по списку)**

**УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

664023, г. Иркутск-23, а/я 85  
Тел.(83952) 559-518, 559-520  
Факс (83952) 559-519  
E-mail: rshn12@fsvps.gov.ru  
<http://38.fsvps.gov.ru>  
03.05.2024 № УФС-ВГ-04/5596  
На №. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
«Информирование»

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» информирует, что на территории Российской Федерации в настоящее время распространяется остро протекающая инфекционная болезнь – вирусный артериит лошадей.

Вирусный артериит лошадей (*arteriitis infectiosa equorum*) – контагиозная, остро протекающая болезнь, встречающаяся у однокопытных и характеризующаяся некротическими поражениями мелких артерий и вен, гиперемией слизистых оболочек, конъюнктивитом, светобоязнью, отечностью век, живота и конечностей, прерыванием жеребости и угнетенностью. Основные поражения наблюдаются в органах дыхания и пищеварения.

Клиническими признаками болезни являются повышение температуры до 39 — 41 °С, гиперемия слизистых оболочек носа и конъюнктивы, слезотечение, серозные выделения из носа, затрудненное дыхание, светобоязнь, отеки век, конечностей, живота, мышечная слабость, шаткая походка, нарушение воспроизводительной функции жеребцов.

Из-за отека легких около 30% больных лошадей страдает нарушением дыхания. Изредка наблюдаются кашель и диарея. Большинство жеребых кобыл (50-80%) абортируют через 10-33 дня после заражения. Околоплодные оболочки обычно изгоняются вместе с плодом. Болезнь продолжается обычно от 3 до 7 дней.

Возможно бессимптомное течение болезни.

Патологоанатомическими изменениями при артериите являются кровоизлияния под плеврой и брюшиной, отек легких, катарально-геморрагический энтерит и колит, кровоизлияния и инфаркты в селезенке, дегенеративные изменения (зернистая дистрофия) печени и почек.

Возбудителем артериита является РНК-содержащий вирус семейства Arteriviridae рода Arterivirus.

Источником возбудителя являются больные лошади. У переболевших жеребцов старше двухлетнего возраста вирус выделяется со спермой на протяжении всей жизни.

Передача возбудителя осуществляется половым, контактным, аэрогенным путями, а также путем трансплацентарной передачи. Факторами передачи возбудителя являются секреты, экскреты, абортированные плоды, околоплодная жидкость, плацента, а также иные объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

Вирусный артериит считается серьезным заболеванием, в острой форме способным привести к смерти лошади. Следует заметить, что вирус опасен только для лошадей и не вызывает заболевания у других видов животных.

На основании клинических проявлений первичный диагноз поставить зачастую проблематично, так как похожие симптомы наблюдают при гриппе, ринопневмонии, хронической форме инфекционной анемии, отравлениях.

В связи с этим решающее значение в диагностике вирусного артериита имеют лабораторные исследования. В случае установления диагноза «вирусный артериит лошадей», на хозяйство накладывают карантин.

Специфических средств лечения нет. Больным животным назначают симптоматическое лечение. В первую очередь, применяют тонизирующие и сердечные средства. Существенное значение имеет борьба с вторичной инфекцией. Для этого используют антибиотики, сульфаниламидные и нитрофурановые препараты.

Прогноз сомнительный, но становится тем благоприятнее, чем раньше освобождают лошадей от работы и чем в лучших условиях содержат. Летальность высокая. Смертельному исходу, наступившему неожиданно, в особенности у молодняка, предшествуют диарея, симптомы колик, отсутствие аппетита и обезвоживание организма.

Общие противозооотические мероприятия направлены на предупреждение заноса возбудителя инфекции в хозяйство, в первую очередь лошадьми из неблагополучного по болезни пункта.

При установлении диагноза хозяйство объявляют неблагополучным и накладывают карантин. Больных животных немедленно изолируют. Трупы и абортированные плоды сжигают. Абортировавших кобыл разрешают переводить в другие хозяйства не ранее, чем через два месяца после ликвидации болезни. Для дезинфекции применяют хлорсодержащие растворы.

Карантин снимают через 1 месяц после последнего случая падежа, убоя или выздоровления животных и после проведения заключительной дезинфекции.

В целях предотвращения возникновения и распространения артериита физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) лошадей, обязаны руководствоваться Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24 сентября 2021 г. N 658 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусного артериита лошадей» (с изменениями и дополнениями).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 377b94545f2a87797f950d285931d6d  
Владелец: Гармаев Василий Петрович  
Действителен с 04.12.2023 до 26.02.2025

В.П. Гармаев