



**ВИЧ-
инфекция о которой
нужно знать.**

**ВИЧ-дальше
чем ты думаешь, но
ближе
чем ожидаешь .**



Презентация предоставлена психологом СПИД - кабинета Васильевой Н.В.

**ВИЧ- инфекция – это заболевание,
вызванное вирусом иммунодефицита.**


**Её характеризуют как медленно текущее
хроническое инфекционное заболевание.**

**СПИД –синдром приобретённого
иммунодефицита.**

**Характеризуется наличием хотя бы одного
из оппортунистических заболеваний
(инфекция лёгких, мозга, потеря веса,
диарея...)**

Вирус Иммунодефицита Человека

(примерный внешний вид вируса)



С 1991 года ВИЧ «присутствует» на территории Иркутской области.

Статистика заболевания

Всего ВИЧ – инфицированных:

- в г.Усолье – Сибирское - 2941 человек.**
- Усольский район – 989 человек.**

Выявлено ВИЧ+ в г.Усолье - Сибирское:

В январе- 12 человек


в феврале - 17 человек

11 человек в минуту, в мире заражаются вирусом ВИЧ.

9 из 10 не знают о том, что заражены.

Заболевание ВИЧ по Усольскому району.

(п Белореченский – самая высокая заболеваемость ВИЧ – инфекцией)



...и СПИД, **не СПИТ!**




ВИЧ «молодеет и взрослеет»

Большинство случаев заражения ВИЧ – инфекцией приходится на возраст от 18 до 40 лет.

18-20 лет
Любовь



30-45
Доверие



68-72
Взрослость



Главное о путях передачи:

1. Через кровь.

- При переливании ВИЧ инфицированной крови и её компонентов или пересадке органов.
- При использовании нестерильного инструментария для инъекций (шприцев, игл) или выполнения татуировок и пирсинга.
- В случае повреждения кожи инструментом, содержащим видимые следы не засохшей крови (например: скальпелем, бритвенным станком ножницами и пр.).



2. Половой путь



- Передача вируса возможна при любом виде незащищенного (без презерватива) проникающего полового контакта.
- Риск передачи ВИЧ **от мужчины женщине в 4 раза выше**, чем от женщины мужчине.
- Если человек заражен другими ИППП, вероятность инфицирования его ВИЧ значительно возрастает.

Помните, что 70% заражения ВИЧ – инфекцией происходит половым путём.

После заражения ВИЧ, человек может на 5й день «передать» инфекцию другому половому партнёру.

Тест на ВИЧ, покажет наличие или отсутствие ВИЧ, не раньше чем через 3-6 мес.

При близких отношениях, от ВИЧ может защитить только презерватив и верность половому партнёру в семейных отношениях.



3. От матери к ребёнку.

Передача вируса может произойти:

- - во время беременности,
- - во время родов,
- - при кормлении грудью.

При проведении комплекса профилактических мероприятий риск можно снизить до 2%.



Что такое "период окна"?

- Организму требуется от 2 недель до 3-6 месяцев, чтобы выработать антитела в количестве достаточном для их обнаружения тест-системой. Этот отрезок времени получил название **«период окна»**.
- Тестирование в этот период может дать отрицательный результат.

В «период окна» в инфицированном человеке уже содержится достаточное количества вируса для заражения других людей.

ВИЧ – инфицированный человек может заражать других уже на 5 день с момента инфицирования.

Вероятность передачи ВИЧ при однократном контакте

- **90-100%** - при переливании крови или её компонентов, зараженных ВИЧ;
- **30-70%** - при инъекционном употреблении наркотиков одним шприцем с ВИЧ - инфицированным;
- **0,3-0,5%**- при уколах иглой, на которой есть следы крови, содержащей ВИЧ;
- **50%**- от ВИЧ -инфицированной матери новорожденному ребенку (естественные роды и грудное вскармливание);
- **30-70%**- анальный секс без презерватива;
- **30-60%**- секс. контакт, когда один из партнеров ВИЧ - инфицирован (ВИЧ -инфицированный *мужчина*);
- **7-30%**- секс. контакт, когда один из партнеров ВИЧ - инфицирован (ВИЧ -инфицированная *женщина*).

Устойчивость возбудителя ВИЧ в окружающей среде

- Чувствителен ко всем известным дез. средствам.
- Погибает при нагревании до 56°C в течение 30 минут.
- Для ВИЧ губительны солнечное и искусственное У/Ф излучение, все виды ионизирующего излучения.
- При высушивании плазмы:
 - при 25°C погибает через 7 суток,
 - при 30°C погибает через 3 суток,
 - при 55°C – через 5 часов.
- В жидкой среде:
 - при температуре $23-27^{\circ}\text{C}$ сохраняет активность 15 дней,
 - при $36-37^{\circ}\text{C}$ – 11 дней.
- В замороженной крови и сыворотке сохраняется годы (10 лет).

Поражённость населения ВИЧ - инфекцией

По областям

1 место.

Иркутская обл.

Среди городов

1 место-

г. Усолье -Сибирское.

2 место-

г. .Иркутск

3 место-

г. Саянск.



Где можно сдать тест на ВИЧ?

(Человек может обратиться самостоятельно, если исполнилось 14 лет.
Дети до 14 лет, могут сдать кровь только в присутствии родственника)


Адрес: Усолье –Сибирское, пр.Комсомольский 56

• Телефон: 7-11-01

Бесплатно можно сдать тест на ВИЧ:

Поликлиника №1 с 9.00 до 10.00, каб.№2
(при себе иметь паспорт)

Результат теста вы получите ч/з 3 дня.



ВИЧ-
дальше
чем ты думаешь, но
ближе
чем ожидаешь.

11 человек в минуту, в мире заражаются вирусом ВИЧ.

9 из 10 не знают о том, что заражены.